

ระวัง !!

โรคพุ่มแฉิมส้มสำหรับปลูก



สาเหตุเกิดจาก “เชื้อไฟโตพลาสมา” ทำให้ต้นส้มสำหรับปลูกมีความผิดปกติส่งผลให้คุณภาพและผลผลิตลดลง เกษตรกรควรป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดของโรค

ลักษณะอาการทั่วไป



ยอดส้มแตกพุ่มฝอยมากกว่าปกติ



ใต้เปลือกมีเส้นสีดำ

ลักษณะอาการตามระยะ

ระยะ 1 – 2 เดือน



มีอาการยอดพุ่มใบเหลือง ยืนต้นตาย

ระยะ 4 – 5 เดือน



ต้นแคระแกร็นแตกยอดเป็นพุ่มฝอย

ระยะเก็บเกี่ยว



เชื้อลุกลามลงหัวใต้เปลือกมีเส้นสีดำ

การป้องกันกำจัด

- ใช้ก่อนพันธุ์ปลอดโรค
- หากพบอาการหลังปลูก :
 - ระยะ 1 เดือน ให้ถอนต้นที่แตกยอดพุ่มผิดปกติทิ้ง
 - ระยะ 4 เดือน ให้ตัด/หักกิ่งต่ำจากบริเวณยอดพุ่ม ประมาณ 30 ซม. ทิ้ง
- ให้น้ำ ปุ๋ยและปรับปรุงดินเพื่อบำรุงต้นส้มสำหรับปลูกให้แข็งแรง
- พ่นสารกำจัดเพลี้ยจักจั่น
- กำจัดวัชพืชในแปลง โดยเฉพาะต้นสาบม่วง

การแพร่ระบาด



ใช้ก่อนพันธุ์ที่เป็นโรคมาปลูก



เพลี้ยจักจั่น (พาหะนำโรค)



ต้นสาบม่วง (พืชอาศัยของโรค)



หากพบ !!

การระบาดของโรค

ขอคำแนะนำได้ที่
สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือ
สำนักงานเกษตรจังหวัด ใกล้บ้านท่าน